

NOTE
SUR SPELÆORHYNCHUS PRÆCURSOR Nn.

PAR

L. G. NEUMANN,

Professeur à l'Ecole vétérinaire de Toulouse.

En 1902, j'ai décrit (1), sous le nom de *Spelæorhynchus præcursor*, des Acariens très particuliers, trouvés dans la collection d'*Ixodidæ* du Muséum de Berlin, et qui ne portaient pas d'autre indication que « ohne Vaterland ». Comme ils étaient accompagnés d'un *Hyalomma ægyptium* (L.) ♀, j'ai supposé provisoirement, avec bien des réserves, qu'ils étaient originaires de l'Afrique et peut-être parasites du Bœuf.

Cette supposition était erronée, car la réunion des *Spelæorhynchus* et d'un *Hyalomma* était toute fortuite et le résultat des manipulations, comme il appert d'une nouvelle rencontre du même Acarien dans la collection du British Museum. Ici, son origine est nettement indiquée par une étiquette portant « From Carollia brevicauda. Pernambuco. — J. F. G. Smilh Esq. ».

Bien que cet Acarien ait le rostre mutilé, son identité avec les premiers *Spelæorhynchus* ne fait pas de doute. Il faut en conclure que *Sp. præcursor* est originaire de l'Amérique tropicale et se trouve sur les Chiroptères.

(1) G. NEUMANN, *Spelæorhynchus præcursor* n. g., n. sp., nouvel Acarien parasite. *Archives de Parasitologie*, V, p. 31, 1902.